



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

2014 - "Año internacional de la Agricultura Familiar" (FAO)

PRIMERA DÉCADA DE JUNIO 2014

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Elida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18731/18733)

Correo Electrónico:

agro@smn.gov.ar


BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA de JUNIO de 2014


Características sobresalientes de la primera década de junio de 2014: condiciones meteorológicas cercanas a las normales.

En la primera década de junio, las temperaturas máximas presentaron anomalías (con respecto a los valores medios del período 1961-1990) positivas en todo el centro del país, mientras que las mínimas

TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014




ANOMALIA TEMPERATURA MÁXIMA
(normal 1961-90)
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014




resultaron superiores a las normales principalmente en las provincias del noroeste y el norte de la Patagonia. Se destacan el centro de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, donde se alcanzaron marcas térmicas inferiores a 3 °C durante más de 6 días.


TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014



ANOMALIA TEMPERATURA MÍNIMA
(normal 1961-90)
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014




DIAS CON TEMPERATURA MINIMA INFERIOR A 3°C
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014




En esta última región, se registraron más de 6 días con temperaturas de suelo inferiores a 0°C.

DIAS CON TS MINIMA INFERIOR A 0°C
PRIMERA DÉCADA DE JUNIO DE 2014



Las precipitaciones fueron muy abundantes en la zona del sur de Neuquén y escasas o nulas en todo el norte y centro del territorio y norte de la Patagonia, con excepción de Misiones, parte de Entre Ríos y sudeste de Buenos Aires, aunque las

anomalías (con respecto al valor medio del período 1961-1990) registradas no superaron, en valor absoluto, los 50 mm en ninguna región.



En concordancia con el campo de precipitaciones, se observaron secamientos de los suelos en una extensa área del noreste del país y humedecimientos en el sur. A pesar de que las condiciones hídricas de los suelos (análisis no válido en áreas de montañas y sierras, ni en zonas inundadas por desborde de ríos) califican, de acuerdo con el índice analizado, como óptimas en casi toda la provincia de Buenos Aires, la situación continúa siendo crítica para las labores agropecuarias en el noreste y sudeste de la provincia.

