

Resumen

Área total afectada por sequía




35.600.679 hectáreas.

Variación del área afectada respecto a Septiembre



9M Hectáreas Aprox.

La superficie total en sequía aumentó más de un 30% respecto del mes anterior. La categoría moderada se expandió considerablemente en Patagonia, que transita como región 41 meses consecutivos con algún grado de sequía. La categoría leve volvió a manifestarse en NEA, Centro y NOA, aunque con una superficie afectada a nivel regional menor al 10%. Cuyo se mantiene sin sequía aunque algunas regiones de Mendoza se determinaron "en observación".



Factores en riesgo

Stock Bovino



113.298 Cabezas

Cultivos



0 Hectáreas\*

Población



0 Hogares\*\*

\* Aclaración: el cálculo de las has de cultivos afectados se realiza mediante el cruce entre el área en sequía moderada y severa y las categorías regular, mala y muy mala informadas por los delegados del SAGYP para estimaciones agrícolas.

\*\* Este dato no contempla capitales de provincias ni distritales. Se calcula exclusivamente en casos de área afectada por categoría severa.

Indicadores

 **Precipitaciones**

Se registraron déficits de lluvia en gran parte del país con excepción de la provincia de Buenos Aires, centro de Mesopotamia, NOA y extremo sudoeste de Patagonia. La persistencia de déficits de precipitaciones en Patagonia oeste hace que se registre, en esta zona, uno de los años más secos desde 1961. Las condiciones del ENOS se mantienen neutrales con probabilidad cercana al 70% de tener condiciones frías (tipo La Niña) durante el próximo trimestre.

 **Hidrología**

Normalización del marco climático sobre el alto Paraná durante octubre. La mejora se sostendría, mientras las cuencas de Paraguay y Uruguay evolucionen en leve descenso. Escasez dominante en los próximos meses en la región formadora de los grandes ríos. Se espera una situación de bajante moderada. Río Paraná en territorio argentino: aguas bajas oscilantes, sin expectativa de repunte significativo. Río Uruguay: frecuencia normal de eventos moderados, con aguas medias en todo su curso.

 **Impacto**

En el sudeste de Santiago del Estero se reportó una moderada afectación en el estado del cultivo de trigo, que se encuentra en etapa de cosecha con rendimientos muy dispares. También se registraron impactos moderados en la disponibilidad de forraje, necesidad de suplementación alimentaria y leves disminuciones en la condición corporal del ganado. En Formosa, se informaron leves afectaciones en el rendimiento de los cultivos y en la condición del forraje, junto con una moderada afectación en la condición corporal del ganado, lo que repercute en los índices de preñez. En algunas zonas, incluso se reportó la necesidad de acarreo de agua. Río Negro muestra la situación mas compleja a nivel país. Se calificó como moderada la afectación en el abastecimiento de agua para riego, en la disponibilidad forrajera, en la condición corporal del ganado, en los índices de preñez y parición, así como en el abastecimiento de agua para bebida animal. Además, se informó una moderada afectación en el suministro de agua para consumo domiciliario.

 **Indices de vegetación**

La actividad fotosintética se mantuvo en niveles similares o superiores al promedio de la serie histórica en gran parte del país, especialmente en la región Centro y el noreste argentino, donde predominan valores por encima del promedio e incluso del máximo de la serie. En contraste, se destacaron anomalías negativas marcadas en amplios sectores de la Patagonia, particularmente en el norte y centro de la región, donde el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada se ubicó por debajo del promedio y, en zonas localizadas, por debajo del mínimo histórico.

 **Humedad de suelos**

Se observó un incremento paulatino de las condiciones de sequía en el norte patagónico. Los suelos de las regiones del norte y centro del país y sur del Litoral sufrieron un desecamiento generalizado, el cual se revirtió en los últimos días del mes en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.