



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

2017 - "Año internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo" (FAO)

PRIMERA DÉCADA DE JULIO 2017

Edición: Natalia Soledad Bonel
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores: Natalia Soledad Bonel
Elida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal: Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina


Teléfonos: 5167-6767 (interno 18731/18733)

Correo Electrónico: agro@smn.gov.ar



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA de JULIO de 2017



En la primera década de julio se destacaron las siguientes configuraciones sinópticas: la presencia de un sistema de presión alta, a comienzos del período, sobre el centro-este del país provocó vientos del norte acompañado de ráfagas con un aumento de las temperaturas; a mediados de la década, pasajes de frentes frío provenientes de la Patagonia que llegaron hasta la región central del país, la permanencia de un frente estacionario en el centro-este y en el norte del país, hasta el final del período, así como sucesivos pasajes de perturbaciones de niveles medios de la atmósfera; y, por último, la presencia de un centro de baja presión en Buenos Aires seguido por un sistema de altas presiones. En el plano de las temperaturas, las máximas mostraron anomalías (respecto de la media para el período 1981-2010.) positivas principalmente en el NEA y el Litoral, sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, donde se identificaron diferencias con la media (valor promedio para el período 1981-2010) mayores a 4°C.




Las mínimas presentaron desvíos** positivos en casi toda la región, con diferencias superiores a 5°C en varias zonas del norte, centro y sur del país; se observó, además, una disminución en la frecuencia de heladas en la región Pampeana.



Se registraron precipitaciones en varias zonas; en el norte del territorio, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, gran parte de Buenos Aires, La Pampa y este de Río Negro y Chubut, superaron a la normal* y principalmente, en el norte del Litoral, sur de Neuquén y oeste de Chubut resultaron deficitarias para la década de estudio. Se puede también observar esta distribución de lluvias mediante la mediana de la precipitación acumulada en 10 días en el período normal 1981-2010, donde se realzan las regiones mencionadas.



Se produjo un marcado humedecimiento de los suelos en Entre Ríos y el noreste de Buenos Aires, mientras que en la región Pampeana continúan las condiciones hídricas que van de excesos a déficits (en este índice no se ven reflejados los excedentes hídricos provocados por desbordes de ríos y arroyos, así como tampoco la permanencia de encharcamientos, debido a que no logran ser identificados por la metodología utilizada).



En relación a la radiación solar directa, se distinguen mínimos relativos en el norte del país, Santiago del Estero, sur de Santa Fe, este de Buenos Aires, este de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

