



Servicio
Meteorológico
Nacional
Argentina

2021

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

PRIMERA DÉCADA DE FEBRERO 2021

"2021-Año Internacional de las Frutas y Verduras" (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
María Gabriela Marcora
Departamento Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18731/18733)


Correo Electrónico:

agro@smn.gov.ar





BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO


PRIMERA DÉCADA de FEBRERO de 2021

Durante esta década, los centros anticiclónicos del Atlántico y del Pacífico, ubicados a escasa distancia de las costas, inhibieron la llegada de aire frío proveniente del sur a la meseta patagónica, mientras que todo el norte del país estuvo afectado mayormente por masas de aire de origen oceánico. Las precipitaciones registradas se concentraron en esta última región del país y parte del este de la Patagonia, y resultaron superiores a las normales en estaciones de Tucumán, La Rioja, Catamarca y del centro del Litoral. En las zonas restantes fueron escasas, principalmente en el norte mesopotámico y el centro-este del territorio nacional.



Las temperaturas mostraron un patrón de anomalías dipolar, con valores negativos en el norte y centro y positivos en la Patagonia, y mayores desvíos hacia ambos extremos en las máximas. Esto se reflejó en la cantidad de días con temperaturas superiores a 30 °C, donde se observa que en gran parte del sur del país se alcanzó dicho registro en por lo menos la mitad de los días del periodo, mientras que en la región central, esto ocurrió en entre uno y cuatro días.





En algunas zonas, las recargas del suelo dieron como resultado excesos hídricos, pero en general el contenido de humedad del suelo se mantuvo cercano a los valores de la década anterior o sufrió secamientos, siendo éstos muy intensos en el norte de la Mesopotamia y levemente menores en el oeste de la región pampeana.

