

Boletín Climatológico

Marzo
2026

BOLETÍN CLIMATOLÓGICO

BOLETÍN DE VIGILANCIA DEL CLIMA EN LA ARGENTINA

VOLUMEN XXXVIII - MARZO 2026

Editoras:

María de los Milagros Skansi
Norma Garay

Colaboradores:

Svetlana Cherkasova
Myrian Díaz
José Luis Stella
Hernán Veiga

La fuente de información utilizada en los análisis presentados en este Boletín es el mensaje SYNOP elaborado por las estaciones sinópticas de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas. De ser necesario, esta información es complementada con los mensajes CLIMAT confeccionados por las estaciones meteorológicas que integran la red de observación del mismo nombre.

También son utilizados datos proporcionados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y distintas instituciones de los gobiernos de la provincias de Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. Como no se cuenta con valores de referencia para todas las estaciones existe más información de datos observados que desvíos de los mismos. Estos datos se incluyen para completar el análisis climático.



clima@smn.gov.ar



www.smn.gov.ar/boletines/boletin-climatológico-mes-año



Servicio Meteorológico Nacional
Av. Dorrego 4019 (C)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina

Contenido

PRINCIPALES ANOMALÍAS Y EVENTOS EXTREMOS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

1 - PRECIPITACIÓN

1.1 - Precipitación media2

1.2 - Precipitación diaria4

1.3 - Frecuencia de días con lluvia4

2 - TEMPERATURA

2.1 - Temperatura media6

2.2- Temperatura máxima media.....7

2.3 - Temperatura mínima media9

2.4- Temperaturas extremas 11

2.5- Ocurrencia de Ola de calor 12

3 - FENÓMENOS DESTACADOS

3.1 - Frecuencia de días con cielo cubierto 13

3.2 - Frecuencia de días con tormenta 14

3.3 - Frecuencia de días con granizo 15

3.4 - Frecuencia de días con niebla y neblina 15

3.5 - Frecuencia de otros fenómenos 17

4 - REGIÓN SUBANTÁRTICA Y ANTÁRTICA ADYACENTE

4.1 - Temperatura 18

4.2 - Principales registros de temperatura21

ABREVIATURAS Y UNIDADES

RED DE ESTACIONES

PRINCIPALES ANOMALÍAS Y EVENTOS EXTREMOS

En el siguiente esquema se presentan, en forma simplificada, las principales anomalías climáticas y eventos significativos que se registraron en el país durante el presente mes.

Lluvias y tormentas fuertes; inundaciones - NOA, Cuyo, este de La Pampa y centro del Litoral: dentro de las zonas mencionadas a lo largo del mes tuvieron lugar eventos de tormentas de variada intensidad dejando acumulados diarios entre 50 mm y 200 mm. La localidad más afectada fue Metán, en el sur de Salta, que durante el día 5, producto de una intensidad de lluvia excepcional, provocó inundaciones repentinas. Otros eventos destacados afectaron a Tartagal (88 mm el 21), Tucumán (84.7 mm el 21), Monte Caseros (108 mm el 12), Paraná (90.8 mm el 18), entre otros.


Ola de calor / Altas temperaturas - Extremo noreste del país y sudeste de Patagonia:

altas presiones predominaron sobre gran parte del continente y sobre el Océano Atlántico Sur promoviendo la persistencia de condiciones más cálidas de lo normal en gran parte del país. En las áreas afectadas por ola de calor las temperaturas, en promedio, se ubicaron entre 3°C y 4°C por encima de lo normal.

Sequía - este de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, norte del Litoral, sur de Córdoba y Patagonia central:

las escasas lluvias agravaron las condiciones de sequía hacia el este del país

Eventos meteorológicos destacados y valores diarios extremos registrados en marzo 2026



CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

1 - PRECIPITACIÓN

1.1 - Precipitación media

En marzo se observan precipitaciones superiores a 150 mm (Figura 1- isolínea roja), en sectores del NOA, Formosa, Córdoba, centro y sur de Santa Fe, noreste de La Pampa, centro y sur de Buenos Aires y zona cordillerana de Neuquén. Entre los mayores valores se mencionan los que tuvieron lugar en:

- **NOA:** Jujuy (Jujuy con 191 mm y Jujuy Universidad con 157.4 mm), Salta (San José con 468.2 mm, Balapuca con 404.6 mm, y Metán con 331.5 mm) y Tucumán (Ingas con 430 mm, y Monte Redondo 407.1 mm, Lules con 248.1 mm y Tucumán 217 mm)
- **Formosa:** San Martín con 301 mm, El Potrillo con 276 mm, y Las Lomitas con 193 mm;
- **Córdoba:** La Francia con 331.6 mm, y Las Varillas con 311.4 mm;
- **Santa Fe:** Montes de Oca con 259.6 mm, Zavalla con 208 mm, Rafaela con 172 mm, Sunchales con 167 mm y Sauce Viejo con 159 mm;
- **Buenos Aires:** Azul con 365 mm, Olavarría con 311.8 mm, Bolívar con 322 mm, Trenque Lauquen con 315 mm, Nueve de Julio con 296 mm, Bolívar con 293 mm, y Pigüé con 281 mm;
- **La Pampa:** General Pico con 242 mm, y Anguil con 184.2 mm;
- **Zona cordillerana de Neuquén:** Añihuerraqui con 458.4 mm, Cerro Mirador con 452.9 mm, Puesto Antiao con 361.8 mm, El Rincón con 342.2 mm, Cerro Huicuifa con 340.6 mm y Nacientes Arroyo Malalco con 313.1 mm.

En la Tabla 1 se listan las localidades con registros que superaron los valores máximos anteriores.

Por otro lado, precipitaciones inferiores a 30 mm (isolínea negra), se registraron en el oeste de Catamarca y San Juan, noroeste de Tucumán, norte y oeste de Mendoza, centro y este de Neuquén, centro de Río Negro, y gran parte de Chubut y Santa Cruz. En San Juan no se han registrado lluvias. En Jáchal el registro fue de 0.4 mm, en La Granja (Tucumán) de 1.5 mm, en 25 de Mayo (La Pampa) de 3.6 mm, en Calalao del Valle (Tucumán) de 5.6 mm, en Puerto Deseado de 6 mm, en Tinogasta de 8.2 mm, y en Neuquén de 7.2 mm.

Las anomalías con respecto a los valores medios (Figura 2) fueron positivas en gran parte del país, siendo más relevantes en Buenos Aires, este de Córdoba, sur del NOA y sectores de San Luis. Por otro lado, las anomalías negativas más relevantes se dieron en el Litoral, San Juan y sectores de Chaco, Formosa y norte de Buenos Aires

Para una mayor valoración de esas anomalías, en el mapa se han superpuesto las isolíneas que representan el desvío porcentual $\pm 80\%$ del valor medio.

- Las anomalías positivas más relevantes (dentro de la isolínea azul con $+80\%$ del valor medio) se presentaron en Añihuerraqui con $+328.4$ mm ($+252\%$ - Neuquén), Ingas con $+315$ mm ($+270\%$ - Tucumán), Cerro Mirador con $+259.9$ mm ($+135\%$ - Neuquén), Azul con $+251.1$ mm ($+220\%$), Olavarría con $+203.7$ mm ($+188\%$), Pigüé con $+185.2$ mm ($+193\%$) y Benito Juárez con $+181.6$ mm ($+212\%$ - Buenos Aires).

- Las anomalías negativas más significativas (dentro del área que comprende el -80% del valor medio, isolínea en roja), se han dado en La Clotilde con -108 mm (-82% - Chaco), Jáchal con -15.6 mm (-98%) y San Juan con -10.8 mm (-100%).




FIG. 1 -Totales de precipitación (mm)

Récord de precipitación en marzo 2026

Localidad	Precipitación (mm)	Récord anterior (mm)	Periodo de referencia
Azul	365.0	314.3 (2002)	1961-2025
Pigüé	281.0	255.8 (1969)	1961-2025
Santiago del Estero	252.0	202.0 (2015)	1961-2025
El Bolsón	115.0	112.5 (1993)	1961-2025

Tabla 1




FIG. 2 -Desvío de la precipitación con respecto a la normal 1991-2020 (mm)

1.2 - Precipitación diaria

Los eventos diarios de precipitación superiores a los 50 mm se concentraron mayormente en norte del territorio, en sectores del centro del mismo, así como también en la zona cordillerana de Neuquén (Figura 3). Se destaca que hubo totales diarios superiores a 100 mm y que varias localidades registraron en más de un día valores superiores a 50 mm (circulo amarillo). En la Tabla 2 se detallan algunos de los mismos.

Con respecto a la distribución temporal de las lluvias, en general, han sido muy dispares a lo largo del territorio.

Se destaca los 128.7 mm registrados en la localidad de Tucumán, que superó al valor máximo anterior de 124.4 mm del 1985, para el periodo 1961-2025. Igualmente, en la localidad salteña de Metán con un registro de 145 mm, se superó los 106.5 mm del 2010 en el periodo 1995-2025.




FIG. 3 - Localidades con eventos precipitantes diarios de importancia. (Los puntos marrones representan a las estaciones tomadas para el análisis)

Máximo eventos diarios de precipitación en marzo 2026	
Localidad	Precipitación (mm)
Laguna Blanca (Formosa)	194 (día 17)
Palma Sola (Formosa)	183 (día 17)
Azul	171 (día 28)
San Martín (Formosa)	148 (día 22)
Metan (Salta)	145 (día 9)
Tucumán	128.7 (día 10)
Pehuajó	127.8 (día 20)
Tabla 2	

1.3 - Frecuencia de días con lluvia

En el centro y este del NOA, sectores del centro del país y zona cordillerana del noroeste y extremo sur de la Patagonia, el número de días con precipitación fue superior a los 10 días (Figura 4). Los máximos han sido de 22 días en Bajastine, Las Faldas y Pueblo Viejo (las tres en Tucumán), de 21 días en Tartagal, Metan (Salta), Cerro Mirador (Neuquén) y Caspichango (Tucumán), de 20 días en Ushuaia, Villa la Angostura (Neuquén) y Casas Viejas (Tucumán) y de 19 días en Jujuy Universidad, Salta, Tucumán, San José (Salta) y Lules (Tucumán).

Por otra parte, se observaron frecuencias inferiores a los 4 días en el oeste de Catamarca y La Rioja, San Juan, norte y oeste de Mendoza, oeste de La Pampa, sectores del norte y centro de la Patagonia y aisladamente en el este de Chaco. En San Juan no se han registrado lluvias. La frecuencia fue de 1 día en Jáchal, de 2 días en Uspallata (Mendoza), Maquinchao, Trelew, Puerto Vilelas (Chaco) y Calalao del Valle (Tucumán), de 2 días en Uspallata y Puelén (La Pampa) y 3 días en Tinogasta, Chepes, San Martín (Mendoza), Malargüe, Paso de Indios, Villa Río Bermejito (Chaco), 25 de Mayo y La Reforma (las dos en La Pampa).

Hubo más días con lluvia con respecto al valor medio en gran parte del país (Figura 5), siendo los mayores apartamientos en sectores del NOA, sudoeste de Buenos Aires, noreste de Río Negro y oeste de Neuquén. Entre los mayores desvíos se señalan +11 días en Villa la Angostura, Cerro Mirador (Neuquén) y Bajastine (Tucumán), +10 días en Cerro El Mocho y Lago Espejo Chico (las dos en Neuquén) y +9 días en Tartagal y Chapelco.

Por otro lado, en Misiones, este de Corrientes, centro de Córdoba, San Juan y La Rioja las frecuencias fueron menores a los valores medios. Las mayores anomalías negativas correspondieron a Bernardo de Irigoyen y Jáchal con -3 días.




FIG. 4 – Frecuencia de días con lluvia.




FIG. 5 – Desvío de la frecuencia de días con lluvia con respecto al valor medio 1991-2020.

2 - TEMPERATURA

2.1 - Temperatura media

La temperatura media presentó valores superiores a 24°C (isolínea resaltada en negro) en el norte del territorio (Figura 6), en tanto en el norte de Jujuy y el oeste y sur de la Patagonia las marcas estuvieron por debajo de 14°C. Los mayores registros tuvieron lugar en Formosa con 27.2°C, Posadas con 27.1°C, Rivadavia y Las Lomitas con 26.7°C, Ituzaingó con 26.5°C e Iguazú y Oberá con 26.1°C.

Por otro lado, los mínimos con excepción de la zona cordillerana, se dieron en Río Grande y Ushuaia con 8.7°C, El Calafate con 10.3°C, Río Gallegos con 10.7°C y Bariloche con 11.1°C.

Las temperaturas fueron superiores a los valores medios, en el este de Formosa, Chaco, Córdoba y Buenos Aires, Litoral y Santa Fe (Figura 7). Las mayores anomalías correspondieron a Oberá con +2.8°C, Bernardo de Irigoyen con +2.4°C, Ituzaingó y Posadas con +2.0°C, Iguazú con +1.9°C y Formosa con +1.6°C.

Las anomalías negativas se presentaron en sectores de Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y sectores del norte de la Patagonia, siendo de -1.7°C en Chapelco, -1.6°C en Paso de Indios, -1.2°C en Villa General Roca (San Luis), -1.1°C en Maquinchao y -1.0°C en Bariloche y Esquel.




FIG. 6 – Temperatura media (°C)




FIG. 7 – Desvíos de la temperatura media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)

2.2- Temperatura máxima media

La temperatura máxima media fue igual o superior a 32°C (isoterma resaltada en negro) en el noreste del país y sur de la Patagonia con valores inferiores a 18°C (Figura 8). Los máximos valores se dieron en Formosa con 33.9°C, Ituzaingó con 33.7°C, Las Lomitas con 33.6°C, Rivadavia y Posadas con 33.3°C, Iguazú con 32.1°C, Tinogasta y Presidencia Roque Sáenz Peña con 32.6°C, y Resistencia con 32.3°C. Con respecto a los valores mínimos (fuera del área cordillerana) tuvieron lugar en Ushuaia con 12.2°C, Río Grande con 13.3°C, El Calafate con 15.9°C y Río Gallegos con 16.3°C.

En el campo de desvíos de la temperatura máxima (Figura 9) se observa la presencia de anomalías positivas en el norte y este del país y sectores más aislados en el norte de Cuyo. Los valores superiores se dieron en Bernardo de Irigoyen con +2.9°C, Ituzaingó con +2.7°C, Iguazú con +2.6°C, Posadas con +2.3°C, Formosa con +2.2°C, y Mercedes en Corrientes con +2.0°C.

Las anomalías negativas fueron en sectores del NOA, Cuyo, La Pampa y la Patagonia. Los valores más relevantes han sido de -2.8°C en Chapelco, de -2.6°C en Bariloche, de -2.5°C en Beazley (San Luis) y -1.9°C en Victorica (La Pampa).

El comportamiento a nivel de décadas (Figura 10) destaca que las anomalías positivas tuvieron mayor presencia en la tercera década, seguida por la segunda y en menor medida en la primera. Por otro lado los valores negativos se dieron con mayor extensión en la primera década, y en la segunda y tercera se presentaron mayormente en la Patagonia.




FIG. 8 – Temperatura máxima media (°C)





FIG. 9 – Desvíos de la temperatura máxima media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)



2.3 - Temperatura mínima media

La temperatura mínima media (Figura 11) fue inferior a 8°C (isoterma resaltada en negro) en el norte de Jujuy y gran parte de la Patagonia, en tanto que en el norte del país fue superior a 20°C. Los mínimos valores se dieron en Río Grande con 4.1°C, El Calafate con 4.5°C, Esquel con 5.1°C, Chapelco con 5.5°C, Bariloche y Ushuaia con 5.6°C, y Maquinchao con 5.8°C.

Los valores máximos fueron de 22.5°C en Posadas, 22.2°C en Rivadavia, 22.1°C en Las Lomitas, 21.8°C en Formosa y 21.6°C en Orán.

Las anomalías han sido positivas mayormente al norte de los 40°S y en sectores aislados de la Patagonia (Figura 12). Fueron de +2.9°C en Oberá, de +2.8°C en Tilisarao (San Luis), de +2.4°C en Santa Rosa de Conlara (San Luis), de +2.2°C en Viedma y de +2.1°C en Posadas.

Las anomalías negativas no superaron los -1°C, siendo de -0.7°C en Maquinchao, Esquel y Perito Moreno y de -0.5°C en Río Colorado.

Las anomalías para cada década del mes (Figura 13) indican temperaturas superiores a las normales en la segunda y tercera década, siendo máximas con valores superiores a los +2°C en la tercera. Las anomalías negativas fueron más localizadas y de menor magnitud.




FIG.11 – Temperatura mínima media (°C)






FIG. 12 – Desvíos de la temperatura mínima media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)



2.4- Temperaturas extremas

La distribución espacial de las temperaturas máximas absolutas (Figura 14) destaca valores superiores a 38°C (isoterma resaltada en celeste) en el este de Salta, Formosa, Chaco, noroeste de Corrientes, Santiago del Estero, este de Catamarca, La Rioja, San Juan y sectores de San Luis y Córdoba. Los valores más relevantes fueron en Monte Quemado en Santiago del Estero con 42.0°C, Juan José Castelli en Chaco con 41.9°C, Presidencia Roque Sáenz Peña y Malbrán en Santiago del Estero con 40.5°C, Las Lomitas con 40.4°C, y Rivadavia, Formosa y San Juan con 40.0°C.

Por otro lado, los valores más bajos se registraron en el extremo sur de la Patagonia en Río Grande con 19.0°C, Río Gallegos con 21.7°C y El Calafate con 22.4°C.






FIG. 15 – Temperatura mínima absoluta (°C)

En cuanto a las temperaturas mínimas absolutas (Figura 15) se observan registros inferiores a 2°C (isoterma resaltada en negro) en gran parte de la Patagonia, sur de Mendoza y norte de Jujuy. Algunos de los registros más bajos en la porción extra andina se dieron en Abra Pampa (Jujuy) con -3.6°C, El Calafate con -3.1°C, Río Grande con -2.4°C, Maquinchao con -2.2°C, Chapelco con -1.6°C y Esquel y Gobernador Gregores con -1.5°C

Las mínimas más altas tuvieron lugar en el norte del país, entre ellas se mencionan los 19.0°C en Posadas, 18.6°C en Orán y 17.8°C en Rivadavia, Formosa e Iguazú.

2.5- Ocurrencia de Ola de calor

Se define ola de calor como un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales que dependen de cada localidad.

Del 27 de marzo al 1 de abril se produjo la entrada de una masa de aire de origen tropical, inusual para la época del año, afectando al noreste y centro del país (Figura 16).

Este evento de ola de calor, si bien se puede caracterizar como débil en cuanto a intensidad, duración y extensión territorial, es de destacar que su desarrollo fue muy tardío ya empezado el otoño austral. En promedio durante este evento se registraron temperaturas entre 5°C y 9°C por sobre lo normal

Mayor información:

https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor_4_27mar_1abr2026.pdf




FIG. 16 – Localidades afectadas por la ola de calor y su duración

3 - FENÓMENOS DESTACADOS

3.1 - Frecuencia de días con cielo cubierto

Durante este período, la mayor frecuencia de días con cielo cubierto se concentró en el Noroeste Argentino (NOA) y en el extremo sur patagónico (Figura 17). Los registros más altos se observaron en las siguientes localidades: 24 días en Salta, 20 días en Orán y Tucumán, 19 días en Jujuy UN y Río Grande, 18 días en Ushuaia y 17 días para las ciudades de Jujuy y Chamental.

En contraste, la nubosidad fue mínima en el este de Cuyo, centro de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de la Patagonia. Se destaca especialmente el caso de Uspallata, que no registró días cubiertos. Le siguieron La Quiaca con solo 1 día, y San Juan con apenas 2 días.

Al analizar los desvíos respecto a la media 1991-2020, predominaron las anomalías positivas en el territorio nacional (Figura 18). Los apartamientos más significativos por encima del promedio fueron de:

- +8 días: Río Colorado
- +7 días: Chamental y El Bolsón
- +6 días: Río Grande
- +5 días: Ituzaingó, Pigüé, Viedma, Chapelco y Paso de Indios

Por el contrario, las anomalías negativas se localizaron principalmente en el oeste del NOA y Cuyo, este de Misiones, Entre Ríos, este de Santa Fe y Villa Reynolds (San Luis). Las reducciones más notables fueron de:

- 5 días: La Quiaca
- 4 días: Bernardo de Irigoyen, Iguazú y Tinogasta
- 3 días: San Juan, Villa Reynolds, Concordia, Paraná y Rosario.





FIG. 17 – Frecuencia de días con cielo cubierto.



3.2 - Frecuencia de días con tormenta

Durante el mes de marzo, la frecuencia de días con tormenta (Figura 19) mostró una actividad sostenida al norte de los 45°S, con valores que superaron los 8 días. Se resaltan núcleos de alta actividad en el norte del NOA, centro de Chaco y Formosa, Misiones, sectores de Córdoba, este de La Pampa, sur de Buenos Aires y este de Río Negro, sobresaliendo las siguientes localidades: La Quiaca con 11 días, seguida por Orán, Iguazú, Presidencia Roque Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen y Viedma con 10 días y Villa Dolores y Santa Rosa con 9 días.

En comparación con los valores normales (1991-2020), se aprecia la relevancia de desvíos positivos (Figura 20). Las anomalías positivas se concentraron en el norte del NOA, centro de Formosa y Chaco, sur de Santiago del Estero, norte de Córdoba, oeste y sur de Buenos Aires, este de La Pampa, este de Río Negro. Los apartamientos más significativos fueron de:

+6 días: Oran y Viedma.

+5 días: Villa de María del Río Seco y Río Colorado.

+4 días: La Quiaca, Villa Dolores y Pigüé.

Por el contrario, Los desvíos negativos más acentuados correspondieron a Marco Juárez con -4 días, Aeroparque, y Río Cuarto y Laboulaye con -3 días.




FIG. 19 – Frecuencia de días con tormenta.




FIG. 20 – Desvío de la frecuencia de días con tormenta con respecto al valor medio 1981-2010.

3.3 - Frecuencia de días con granizo

En cuanto a la frecuencia de caída de granizo (Figura 21), se observó un ligero incremento respecto a lo normal (1991-2020) en las provincias de Jujuy, San Juan, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

3.4 - Frecuencia de días con niebla y neblina

Para el mes de marzo la frecuencia de días con niebla tuvo lugar en una zona reducida del territorio. En marzo, la frecuencia de días con neblina superó los 12 días en el sur del NOA, el Litoral, Córdoba y sectores de Buenos Aires (Figura 22). Los registros más destacados se observaron en Tucumán con 26 días, Tres Arroyos con 25 días, Reconquista con 23 días, Venado Tuerto con 21 días, Salta con 20 días, y en Río Cuarto, Laboulaye y Olavarría con 20 días.

Por otro lado, la ocurrencia de niebla fue menor, sin superar los 8 días (Figura 23). Los valores más altos se concentraron en el sudeste bonaerense: Tandil y Dolores con 7 días, seguidos por Pilar, Junín, Las Flores y Azul con 6 días, y finalmente Rosario, Merlo (Buenos Aires) y Olavarría con 5 días.




FIG. 21 – Frecuencia de días con granizo.

En la Figura 24 se muestran los desvíos respecto de los valores medios 1991-2020, donde se observa desvíos negativos en sectores aislados del territorio. Los mayores apartamientos negativos correspondieron a Bernardo de Irigoyen con -4 días y a Ezeiza con -3 días. Los desvíos positivos también se concentraron en áreas reducidas, principalmente en Córdoba y algunos sectores de Buenos Aires. Allí se registraron +3 días en Córdoba, Pilar, Las Flores y Merlo.




FIG. 22 – Frecuencia de días con niebla.




FIG. 23 – Frecuencia de días con neblina.




FIG. 24 – Desvío de la frecuencia de días con niebla con respecto al valor medio 1991-2020 (días).

En el conurbano bonaerense (Figura 25) se observó una mayor frecuencia de neblinas en toda la región, los máximos valores se dieron en Ezeiza y Merlo. Con respecto a las nieblas, las mayores frecuencias se dieron en la zona oeste en Merlo y no se presentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comparando con los valores medios 1991-2020, resultaron ser inferiores a los mismos.




FIG. 25 – Frecuencia de días con niebla y neblina en el Gran Buenos Aires.

3.4 - Frecuencia de otros fenómenos

En cuanto a la frecuencia de días con heladas, esta se reduce a la zona del Comahue, destacando Cerro Nevado con 15 días. El registro de días con nieve para el mes de febrero solo indicó ocurrencias en Ushuaia, con 2 días, y en El Calafate, con 1 día.

4 - REGIÓN SUBANTÁRTICA Y ANTÁRTICA ADYACENTE




A continuación se presentaran los principales registros del mes en las estaciones correspondientes a las bases antárticas argentinas (Figura 26), acompañadas de sus respectivos gráficos y en forma más detallada en una Tabla.

4.1 - Temperatura

Marzo ha presentado temperaturas más cálidas que las normales en todas las bases del sector antártico. Los mayores apartamientos correspondieron a Esperanza y Marambio, los cuales superaron los $+3^{\circ}\text{C}$, siendo el mayor de $+3.9^{\circ}\text{C}$ en la temperatura media en la base Marambio (Gráfico 1).




FIG. 26 – Bases antárticas argentinas.






GRAF. 1 – Anomalia de la temperaturas media , máxima y mínima, con respecto al valor medio 1991-2020.

Los gráficos siguientes muestran la evolución de las temperaturas media, máxima y mínima diaria para las seis bases antárticas (Gráfico 2).




GRAF. 2 – Marcha diaria de la temperatura máxima, media y mínima.




GRAF. 2 – Marcha diaria de la temperatura máxima, media y mínima.

El gráfico 3 muestra las temperaturas máximas diarias más altas y más bajas, igualmente con las mínimas y su comparación con los valores récords dentro del periodo de referencia para cada base. Cabe destacar que los valores de Orcadas (10.7°C) y Carlini (10.9°C) ocupan el segundo lugar en la serie, para la primera 1961-2025 y la segunda 1985-2025 (circulo negro).



GRAF. 3 – Valores más altos y más bajos de la temperatura máxima y mínima, comparados con los valores records.




4.2 - Principales registros de temperatura

Los principales registros del mes en las estaciones correspondientes a las bases antárticas argentinas (Figura 23) son detallados en la Tabla 3.

Principales registros de temperatura durante marzo de 2026							
Bases	Valores medios (anomalía)			Valores absolutos			
	Media (°C)	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Máxima (°C)	Máxima más baja (°C)	Mínima (°C)	Mínima más alta (°C)
Base Orcadas	0.7 (+0.4)	3.2 (+0.8)	-1.6 (0.0)	10.7 (día 11)	-0.3 (día 6)	-5.5 (día 19)	1.8 (día 16)
Base Carlini	2.5 (+1.6)	4.9 (+2.0)	0.7 (+1.9)	10.9 (día 11)	2.2 (día 27)	-3.0 (día 26)	4.0 (día 30)
Base Esperanza	1.3 (+3.3)	5.0 (+3.6)	-2.4 (+2.8)	13.0 (día 11)	-5.9 (día 26)	-12.2 (día 26)	2.3 (día 12)
Base Marambio	-1.6 (+3.9)	1.3 (+3.4)	-4.9 (+3.7)	11.8 (día 8)	-9.2 (día 26)	-12.2 (día 27)	3.4 (día 8)
Base San Martín	1.1 (+1.9)	3.8 (+2.1)	-1.3 (+2.2)	6.4 (día 29)	-0.7 (día 26)	-9.7 (día 26)	2.0 (día 4)
Base Belgrano II	-12.3 (0.0)	-8.5 (+0.6)	-16.1 (+0.4)	-3.5 (día 27)	-15.6 (día 24)	-23.6 (día 11)	-6.3 (día 27)

Tabla 3- Las anomalías son respecto al periodo 1991-2020



ABREVIATURAS Y UNIDADES

CLIMAT: informe de valores medios y totales mensuales provenientes de una estación terrestre.

SYNOP: informe de una observación de superficie proveniente de una estación terrestre.

SMN: Servicio Meteorológico Nacional.

HOA: hora oficial argentina.

UTC: tiempo universal coordinado.

NOA: región del noroeste argentino.

NEA: región del noreste argentino.

IPE: índice de precipitación estandarizado.

°C: grado Celsius.

m: metro.

mm: milímetro.

ULP: Universidad de la Punta

DACC: Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas del Ministerio de Economía de Mendoza

EEAOC: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Tucumán

COREBE: Comisión Regional del Río Bermejo

RED DE ESTACIONES

