

# Boletín Climatológico

Verano  
2025-26

# BOLETÍN CLIMATOLÓGICO

## BOLETÍN DE VIGILANCIA DEL CLIMA EN LA ARGENTINA

### VOLUMEN XXXVIII - VERANO 2025-26

#### Editoras:

María de los Milagros Skansi  
Norma Garay

#### Colaboradores:

Svetlana Cherkasova  
Myrian Díaz  
José Luis Stella  
Hernán Veiga

*La fuente de información utilizada en los análisis presentados en este Boletín es el mensaje SYNOP elaborado por las estaciones sinópticas de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas. De ser necesario, esta información es complementada con los mensajes CLIMAT confeccionados por las estaciones meteorológicas que integran la red de observación del mismo nombre.*

*También son utilizados datos proporcionados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y distintas instituciones de los gobiernos de la provincias de Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. Como no se cuenta con valores de referencia para todas las estaciones existe más información de datos observados que desvíos de los mismos. Estos datos se incluyen para completar el análisis climático.*



[clima@smn.gov.ar](mailto:clima@smn.gov.ar)



[www.smn.gov.ar/boletines/boletin-climatológico-mes-año](http://www.smn.gov.ar/boletines/boletin-climatológico-mes-año)



Servicio Meteorológico Nacional  
Av. Dorrego 4019 (C)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina

# Contenido

## CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

### 1 - PRECIPITACIÓN

1.1 - Precipitación media .....	4
1.2 - Singularidades de la precipitación diaria.....	8
1.3 - Frecuencia de días con lluvia .....	8
1.4 - Frecuencia de días con tormenta .....	10
1.5 - Frecuencia de días con granizo .....	11
1.6 - Frecuencia de otros fenómenos .....	11

### 2 - TEMPERATURA

2.1 - Temperatura media.....	12
2.2- Temperatura máxima media.....	14
2.3 - Temperatura mínima media .....	16
2.4- Ocurrencia de Ola de calor .....	18
2.5 - Frecuencia de días con cielo cubierto .....	18

### 3- REGIÓN SUBANTÁRTICA Y ANTÁRTICA ADYACENTE

3.1 - Temperatura .....	20
3.2 - Principales registros de temperatura .....	21

## ABREVIATURAS Y UNIDADES

## RED DE ESTACIONES

# CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

## 1 - PRECIPITACIÓN

### 1.1 - Precipitación media

Durante el verano de 2025-26 (diciembre, enero y febrero) las precipitaciones fueron superiores a los 400 mm (Figura 1- isolínea roja) en el centro y este del NOA, el NEA y sectores aislados en Córdoba, San Luis y Mendoza. Entre los valores más relevantes se mencionan los que tuvieron lugar en:

- NOA: Jujuy (Jujuy con 541.5 mm y Jujuy Universidad con 434 mm), Salta (Metán con 976.6 mm, San José con 927.2 mm, Cuatro Cedros con 602 mm, Salta con 536 mm y Tartagal con 443 mm), Tucumán (Las Faldas con 948.1 mm, Lules con 790.9 mm, y Tucumán con 636 mm) y Catamarca (Catamarca con 403 mm);
- NEA: Formosa (Comandante Fontana con 590.4 mm y Bartolomé de las Casas con 588.8 mm), Chaco (La Tigra con 798 mm, Resistencia con 644 m y Presidencia Roque Sáenz Peña con 454 mm), Corrientes (Corrientes con 702.7 mm, Montes Caseros con 551 mm, Ituzaingó con 535 mm y Mercedes con 424.8 mm), Misiones (Posadas con 435 mm e Iguazú con 430 mm) y Entre Ríos (Federal con 580.3 mm y Concordia con 480 mm);
- Córdoba: Jesús María con 573.2 mm, Morteros con 471.4 mm y Alta Gracia con 441.2 mm;

Por otro lado, los valores fueron inferiores a 25 mm (isolínea negra) en gran parte de la Patagonia. Algunos de los valores más relevantes han sido en General Roca (Río Negro) con 3.9 mm, Trelew con 9.9 mm, Los Miches (Neuquén) con 10.8 mm, El Calafate con 11.5 mm, Colan Conhué (Chubut) con 11.5 mm, La Higuera (Neuquén) con 11.6 mm, Comodoro Rivadavia con 12.7 mm, Los Antiguos (Santa Cruz) con 15.4 mm, Puerto Madryn con 16 mm y Paso de Indios con 19.5 mm

Se han registrados valores que han superado a los máximos o mínimos de los anteriores veranos, como se presentan en la Tabla 1.

Los desvíos de la precipitación con respecto a los valores medios 1991-2020 (Figura 2) fueron mayormente negativos siendo máximos en el noreste de Buenos Aires y sectores del norte de la Patagonia. En cuanto a los desvíos positivos se dieron en el NOA, y sectores de Formosa y Chaco. Para una mayor valoración de esas anomalías, en el mapa se han superpuesto las isolíneas que representan el desvío porcentual con respecto al valor medio de  $\pm 60\%$ .

Entre las anomalías negativas más destacadas (dentro del área que comprende el  $-60\%$  del valor medio, isolínea en roja), se mencionan las correspondientes a Guleguaychú con  $-292.5$  mm ( $-74\%$ ), Ezeiza con  $-228.5$  mm ( $-74\%$ ), La Plata con  $-207.6$  mm ( $-65\%$ ), Bolívar con  $-203.3$  mm ( $-63\%$ ), Dolores con  $-201.7$  mm ( $-71\%$ ), El Palomar con  $-199.4$  mm ( $-60\%$ ), Punta Indio con  $-183.7$  mm ( $-62\%$ ), Las Flores con  $-182.3$  mm ( $-66\%$ ).

Las anomalías positivas más relevantes (dentro de la isolínea azul con  $+60\%$  del valor medio) se presentaron en Metán con  $+514.6$  mm ( $+111\%$  - Salta), Las Faldas con  $+379$  mm ( $+67\%$  - Tucumán), Chapes con  $+180$  mm ( $+78\%$ ), Catamarca con  $+174.9$  mm ( $+77\%$ ) y Tinogasta con  $+93.4$  mm ( $+104\%$ ).

A nivel mensual, en general, se han presentado anomalías negativas al sur de los  $35^\circ\text{S}$ , siendo más significativas en Buenos Aires durante enero. Por otro lado, los excesos más importantes se dieron en diciembre en gran parte del norte del territorio, no siendo lo suficiente para revertir el déficit de los meses de enero y febrero en el Litoral (Figura 3).




FIG. 1 -Totales de precipitación (mm)

Records de precipitación en el verano				
	Localidad	Verano 2025-26 (mm)	Valor anterior (mm)	Periodo de referencia
Máximo	Metán (Salta)	976.6	868.2 (1996-97)	1995-2025
	Ezeiza	79.3	80.6 (1978-79)	1961-2025
Mínimo	Tandil	100	100.5 (2008-09)	1961-2025




FIG. 2 -Desvío de la precipitación con respecto a la normal 1991-2020 (mm)




FIG. 3 – Desvío de la precipitación con respecto a la normal 1991-2020 (mm) de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

## Déficit

Al considerar las anomalías porcentuales, los valores más relevantes inferiores al -60%, se han producido en el norte de la Patagonia y noreste de Buenos Aires (Figura 4). Las localidades presentaron lluvias por debajo de los valores medios en general durante los tres meses, siendo las más significativas las del mes de enero y febrero.

## Exceso

La zona con los principales excesos (Figura 4), representando valores superiores al 60% del valor medio, se localizó en el sur del NOA y sectores de Formosa y Chaco. Los excesos en la zona de Catamarca y La Rioja fueron debido a las lluvias registradas en diciembre y enero. Como en el caso de Tinogasta en donde en diciembre se registró 79.9 mm (+274%) y en enero 90.4 mm (+141%), dando como consecuencia que todo el verano registre un desvío de +104%.



FIG. 4 – Desvío porcentual de la precipitación con respecto a la normal 1991-2020 (%)

## 1.2 - Singularidades de la precipitación diaria

Los eventos diarios de precipitación que superaron 50 mm (Figura 5) tuvieron una distribución dispar a lo largo del trimestre. En el mes de diciembre se dieron principalmente en el noreste del país, en tanto que enero con una mayor cantidad de casos, se concentraron en el NOA, Formosa, Chaco y zona central del país y finalmente febrero se dieron en el NOA, sectores del centro-este del país y más aislados en Formosa, Chaco, Misiones y zona cordillerana del sur de Neuquén.

Durante el verano se han superado los máximos valores diarios anteriores, a saber:

*Diciembre - Corrientes con 142 mm registrado el día 25, supero al máximo valor diario anterior de 134.5 mm ocurrido el 3 de diciembre de 1979, para el periodo 1961-2024.*

*Enero - se destacó la precipitación registrada el día 8 en la localidad riojana de Chepes con 165 mm, la cual superó los 91 mm del día 5 de enero de 1994, para el periodo 1961-2024.*

*Febrero – el 5 de febrero en la localidad salteña de Metán con 200 mm, superó al valor anterior de 119 mm del día 12 de febrero de 2000, para el periodo 1995-2025 (con interrupciones). También en Puerto Deseado con 33 mm se superó al valor máximo anterior de 32 mm registrado el 14 de febrero de 2024, para el periodo 1995-2025.*




FIG. 5 - Localidades con eventos precipitantes diarios de importancia. (Los puntos marrones representan a las estaciones tomadas para el análisis)

## 1.3 - Frecuencia de días con lluvia

La frecuencia de días con precipitación fue mayor a 28 días en el centro y sur del NOA, zona serrana de Córdoba y San Luis, Misiones y extremo sur de la Patagonia (Figura 6). Los valores más significativos se han dado en:

- **Jujuy:** Jujuy universidad con 51 días, La Quiaca con 42 días y Jujuy con 36 días;
- **Salta:** Metán con 50 días, Salta con 45 días, San José con 43 días, Balapuca con 39 días y Orán con 33 días;

- **Tucumán:** Lules y El Colmenar con 54 días, Caspichango y Las Faldas con 51 días, Benjamín Paz con 48 días;
- **Misiones:** Bernardo de Irigoyen con 39 días y Posadas con 31 días;
- **Córdoba:** Villa Dolores con 31 días;
- **San Luis:** Pacanta con 35 días, Potrero de Funes con 34 días, Villa Larca con 32 días, y Santa Rosa de Conlara y La Esquina con 31 días;
- **Santa Cruz:** Río Gallegos con 34 días;
- **Tierra del Fuego:** Ushuaia con 45 días y Río Grande con 35 días.

*Se destaca la frecuencia ocurrida en la localidad catamarqueña de Tinogasta con 35 días, la cual ha superado al máximo anterior de 28 días del verano 1978-79 para el periodo 1961-2025.*

Por otro lado, frecuencias iguales o inferiores a 8 días tuvieron lugar en gran parte de la Patagonia. En las localidades de El Calafate, Villa Llanquín (Neuquén) con 3 días, Neuquén y Huechahue (Neuquén) con 4 días, San Antonio Oeste y Las Coloradas (Neuquén) con 5 días y Chapelco, Maquinchao, Puerto Madryn, Cajón de los Chenques, La Higuera y Los Carrizos (los tres en Neuquén) con 6 días.

Las anomalías con respecto a los valores medios del periodo 1991-2020 (Figura 7) muestran una mayor presencia de anomalías negativas, ubicándose en centro y sur del Litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y sectores menores en norte de Salta, San Luis, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Los valores más relevantes fueron en Galeguaychú, Junín y Las Flores con -10 días, Ceres y La Plata con -9 días y Reconquista, Mercedes, Punta Indio, Tres Arroyos y Cuatro Cedros (Salta) con -8 días.




FIG. 6 – Frecuencia de días con lluvia.

Las anomalías positivas se dieron en sur del NOA y sectores aislados de la Patagonia, Chaco, San Luis y Mendoza. Los mayores apartamientos fueron de +21 días en Tinogasta, El Colmenar y Lules (ambas en Tucumán).




FIG. 7 – Desvío de la frecuencia de días con lluvia con respecto al valor medio 1991-2020.

## 1.4 - Frecuencia de días con tormenta

La frecuencia de días de tormenta tuvo lugar al norte de los 45° de latitud sur. Se distingue Tucumán con 39 días; Salta con 35 días; Villa Dolores con 33 días; La Quiaca y Jujuy con 32 días y Bernardo de Irigoyen y Santa Rosa con 30 días (Figura 8).

En tanto que el desvío con respecto a los valores medios muestra un leve predominio de valores negativos, donde sobresalen con -10 días Gualeguaychú, Laboulaye, General Pico y Tandil, con -9 días Marcos Juárez, con -8 días Aeroparque, y con -7 días Mercedes en Corrientes.

Las anomalías positivas se localizaron mayoritariamente en el sur del NOA, el oeste de la región chaqueña y parte de Cuyo (Figura 9). Se destacan por su desviación: +16 días en La Rioja, +14 días en Tucumán, +12 días en Catamarca, +8 días en Jujuy, Salta y Catamarca, y +7 días en Santiago del Estero y Villa Dolores.




FIG. 8 – Frecuencia de días con tormenta.




FIG. 9 – Desvío de la frecuencia de días con tormenta con respecto al valor medio 1981-2010.

## 1.5 - Frecuencia de días con granizo

Durante este período, se reportó la caída de granizo en diversas estaciones meteorológicas del SMN, con una distribución geográfica que abarcó desde el Norte Argentino hasta la Patagonia. Las provincias afectadas incluyeron a Jujuy, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y diversos puntos del sur del país. Las ciudades de Río Gallegos, San Rafael y La Quiaca registraron las frecuencias más altas. Los valores registrados fueron levemente superiores para el periodo 1991-2020, para esta época del año (Figura 10).

## 1.6 - Frecuencia de otros fenómenos

La frecuencia de días con nieve para los sitios de la red observacional del SMN solo tuvo lugar en la ciudad de Ushuaia durante los meses de diciembre y enero. Sin embargo, se destaca un evento de nevada excepcional en la región andina de Río Negro y Neuquén el 10 de febrero de 2026, que cubrió de blanco las cumbres de San Carlos de Bariloche (incluyendo el Cerro Cathedral) y la zona de El Bolsón.

Durante el trimestre diciembre-febrero, los días con niebla fueron casi nulos en comparación con la frecuencia de neblina.




FIG. 10 – Frecuencia de días con granizo.

## 2 - TEMPERATURA

### 2.1 - Temperatura media

La temperatura media presentó valores iguales o superiores a 26°C (isolínea resaltada en negro) en el norte del territorio, este de Catamarca, La Rioja y San Juan (Figura 11), en tanto en el sur de la Patagonia y norte de Jujuy las marcas estuvieron por debajo de 16°C. Entre los mayores registros se mencionan los que tuvieron lugar en Rivadavia con 29.0°C, Monte Quemado (Santiago del Estero) con 28.5°C, Las Lomitas con 28.0°C, Formosa con 27.5°C y Tartagal con 27.2°C.

Por otro lado, los mínimos, con excepción de la zona cordillerana, se dieron en Ushuaia con 9.4°C, Río Grande con 11.0°C, La Quiaca con 13.6°C, Río Gallegos con 13.8°C, Abra Pampa (Jujuy) con 14.1°C y El Calafate con 14.2°C.

Las temperaturas fueron más cálidas que las normales en gran parte del país (Figura 12). Los mayores desvíos fueron de +1.9 °C en El Bolsón, +1.6°C en Neuquén, +1.5°C en Tartagal y Bariloche y +1.4°C en Tandil, Pigüé, Esquel y Unión (San Luis).

A nivel mensual (Figura 13), las anomalías positivas tuvieron una mayor presencia en los tres meses siendo el mes de enero el que presentó las mayores magnitudes sobre la Patagonia. Por otro lado, las anomalías negativas con mayor extensión se dieron en diciembre, siendo suficientes para normalizar o atenuar las anomalías del trimestre en la zona.




FIG. 11 – Temperatura media (°C)






FIG. 12 – Desvíos de la temperatura media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)




FIG. 13 – Desvío de la temperatura media con respecto a la normal 1991-2020 (°C) de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

## 2.2- Temperatura máxima media

La temperatura máxima media fue superior a 34°C en el norte del territorio y sectores de Cuyo e inferior a 22°C en el sur de la Patagonia (Figura 14). Entre los mayores valores se mencionan 36.9°C en Rivadavia y Monte Quemado (Santiago del Estero), 36.2°C en La Botija (San Luis), 35.5°C en Andalgalá (Catamarca), 35.4°C en Quimilí (Santiago del Estero), 35.3°C en Beazley (San Luis) y 35.2°C en Las Lomitas. Con respecto a los valores mínimos (fuera del área cordillerana) tuvieron lugar en Ushuaia con 13.4°C, Río Grande con 16.7°C, El Calafate con 19.5°C, Río Gallegos con 20.6°C y Santa Cruz con 20.8°C.

La temperatura máxima media ha presentado anomalías positivas en gran parte del territorio (Figura 15), siendo máximas en El Bolsón con +2.5°C, Coronel Suarez con +2.0°C, Tartagal, Olavarría, y Tres Arroyos con +1.9°C y Tandil con +1.8°C.

Durante los tres meses del verano las anomalías positivas estuvieron presentes en gran parte del país, donde enero presentó los mayores apartamientos superando los +3°C en el oeste de la Patagonia. En cuanto a las anomalías negativas fueron más reducidas y se dieron en lugares más dispares en los tres meses (Figura 16).




FIG. 14 – Temperatura máxima media (°C)




FIG. 15 – Desvíos de la temperatura máxima media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)




FIG. 16 – Desvío de la temperatura máxima media con respecto a la normal 1991-2020 (°C) de diciembre 2025, enero y febrero 2026 - (°C)

## 2.3 - Temperatura mínima media

La temperatura mínima media (Figura 17) fue inferior a 10°C en el norte de Jujuy y oeste y sur de la Patagonia, en tanto que en el norte del país fue superior o igual a 22°C. Los mínimos valores se dieron en Río Grande con 5.1°C, Abra Pampa (Jujuy) con 5.3°C, Ushuaia con 6.2°C, Colan Conhué (Chubut) con 7.1°C, El Calafate con 7.5°C, Río Gallegos con 7.7°C, La Quiaca con 7.9°C, Bariloche con 8.2°C y Chapelco y Santa Cruz con 8.6°C.

En tanto, los valores máximos se han dado en Rivadavia con 22.9°C, Las Lomitas con 22.3°C, Quimilí (Santiago del estero) con 22.2°C, y Oran y Pizarro (Salta) con 22.1°C.

Las temperaturas fueron superiores a normales en gran parte del territorio (Figura 18). Los valores más relevantes fueron en Unión (San Luis) con +2.6°C, Bariloche y Anchorena (San Luis) con +2.3°C, Las Flores, Buenos Aires Observatorio y Dolores con +2.2°C y Pehuajó, Neuquén y Paso de Indios con +2.0°C.

A nivel mensual (Figura 19) las anomalías positivas estuvieron presentes en los tres meses, donde el mes de diciembre presentó la mayor extensión. En cuanto a las negativas, enero presentó una mayor presencia en el centro-este del país.




FIG.17 – Temperatura mínima media (°C)




FIG. 18 – Desvíos de la temperatura mínima media con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)






FIG. 19 – Desvío de la temperatura mínima media con respecto a la normal 1991-2020 (°C) de diciembre 2025, enero y febrero 2026 – (°C)



## 2.4- Ocurrencia de Ola de calor

Se define ola de calor como un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales que dependen de cada localidad.

Durante el verano 2025-26 se han producido 3 eventos de ola de calor con diferentes periodos de duración.

### -29 de diciembre a 6 de enero

La característica de este evento fue mayormente su corta duración y poca extensión territorial (Figura 20 - izquierda). La máxima duración se dio en Paraná con 5 días.

Más información en [https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor\\_1\\_29dic\\_6ene2026.pdf](https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor_1_29dic_6ene2026.pdf)

### -20 de enero al 2 febrero

Este evento presentó una mayor extensión y variada duración. Su máxima duración fue de 10 días en Neuquén, siendo un récord para el periodo 1961-2025 (Figura 20- centro).

Más información en [https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor\\_2\\_20ene\\_2feb2026.pdf](https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor_2_20ene_2feb2026.pdf)

### -16 al 22 de febrero

Este evento se caracterizó por su corta duración. Su máxima duración fue de 4 días (Figura 10 - derecha).

Más información en [https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor\\_3\\_16\\_22feb2026.pdf](https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/Oladecolor_3_16_22feb2026.pdf)




FIG. 20 – Localidades afectadas por la ola de calor y su duración

## 2.5 - Frecuencia de días con cielo cubierto

La frecuencia de días con cielo cubierto durante la temporada estival superó los 30 días en el NOA, el este de Misiones y el centro y sur de la Patagonia. Los valores máximos se concentraron en el extremo sur y el noroeste: Ushuaia lideró con 59 días, seguida por Santa Cruz (53 días) y Río Grande (50 días). Otros registros elevados incluyeron a Jujuy UN, Salta y Río Gallegos con 47 días; Jujuy con 44 días, y finalmente Orán, Tucumán y El Calafate con 42 días (Figura 21).

En contraste, los valores más bajos —de entre 2 y 7 días— se registraron en el sur de Cuyo, el oeste de La Pampa y el norte de la Patagonia. Los mínimos destacados fueron en Neuquén (2 días), Maquinchao (3 días), Malargüe (5 días), San Antonio Oeste y Trelew (7 días).

Respecto a los valores medios históricos (1991-2020), predominaron las anomalías negativas (Figura 22). Los desvíos más significativos hacia condiciones menos nubladas de lo habitual ocurrieron en:

Resistencia: -15 días.

Bernardo de Irigoyen y Corrientes: -12 días.

Tartagal y Buenos Aires (Observatorio): -10 días.

La Quiaca, P. R. Sáenz Peña, Iguazú, Ezeiza, Olavarría, Pigüé y Tres Arroyos: -9 días.

Por otro lado, las anomalías positivas se restringieron al norte de Cuyo y al extremo sur de la Patagonia. Los apartamientos más notables se dieron en El Calafate (+15 días), San Julián (+9), Jáchal (+7), y Santa Cruz (+6).




FIG. 21 – Frecuencia de días con cielo cubierto.




FIG. 22 – Desvíos de la frecuencia de días con cielo cubierto con respecto al valor medio 1991-2020 – (°C)

### 3- REGIÓN SUBANTÁRTICA Y ANTÁRTICA ADYACENTE

A continuación se presentarán los principales registros del verano 2025-26 en las estaciones correspondientes a las bases antárticas argentinas (Figura 23), acompañadas de sus respectivos gráficos y en forma más detallada en una Tabla.




#### 3.1 - Temperatura

El verano presentó mayormente temperaturas superiores a las normales, con la excepción de Orcadas, Marambio (en la temperatura máxima) y Belgrano II, las cuales fueron negativas, no superando los  $-0.4^{\circ}\text{C}$ . El mayor apartamiento positivo se dio en San Martín con  $+1.4^{\circ}\text{C}$  en la máxima,  $+1.3^{\circ}\text{C}$  en la mínima, seguida de  $+1.2^{\circ}\text{C}$  en la media (Gráfico 1).

Se menciona que los valores de las tres temperaturas medias en la base San Martín han ocupado el segundo valor en la serie 1976-2025.



FIG. 23 – Bases antárticas argentinas.




GRAF. 1 – Anomalía de la temperaturas media , máxima y mínima, con respecto al valor medio 1991-2020.

### 3.2 - Principales registros de temperatura

Los principales registros del mes en las estaciones correspondientes a las bases antárticas argentinas (Figura 23) son detallados en la Tabla 2.

Principales registros de temperatura durante el verano 2025-26							
Bases	Valores medios (anomalía)			Valores absolutos			
	Media (°C)	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Máxima (°C)	Máxima más baja (°C)	Mínima (°C)	Mínima más alta (°C)
Base Orcadas	0.8 (-0.3)	3.2 (-0.1)	-1.2 (-0.2)	10.8 (30-ene-2026)	-2.8 (8-feb-2026)	-5.6 (5-dic-2025)	1.6 (29-ene-2026)
Base Carlini	2.2 (+0.4)	4.2 (+0.4)	0.4 (0.0)	9.4 (27-feb-2026)	-3.6 (10-feb-2026)	-5.3 (11-feb-2026)	3.7 (21-feb-2026)
Base Esperanza	1.3 (0.2)	4.3 (+0.3)	-1.7 (0.0)	12.8 (29-ene-2026)	-3.0 (10-feb-2026)	-7.2 (10-feb-2026)	2.5 (22-feb-2026)
Base Marambio	-1.3 (0.0)	1.0 (-0.3)	-3.5 (+0.1)	10.0 (29-ene-2026)	-6.4 (10-feb-2026)	-9.7 (11-feb-2026)	2.1 (26-feb-2026)
Base San Martín	2.4 (+1.2)	5.2 (+1.4)	0.1 (+1.3)	9.3 (28-ene-2026)	-1.5 (9-feb-2026)	-7.5 (10-feb-2026)	4.2 (26-ene-2026)
Base Belgrano II	-4.3 (-0.2)	-0.6 (+0.1)	-7.8 (+0.2)	5.5 (2-ene-2026)	-8.5 (26-feb-2026)	-15.8 (20-feb-2026)	-0.3 (3-ene-2026)

Tabla 2- Las anomalías son respecto al periodo 1991-2020



## ABREVIATURAS Y UNIDADES

**CLIMAT:** informe de valores medios y totales mensuales provenientes de una estación terrestre.

**SYNOP:** informe de una observación de superficie proveniente de una estación terrestre.

**SMN:** Servicio Meteorológico Nacional.

**HOA:** hora oficial argentina.

**UTC:** tiempo universal coordinado.

**NOA:** región del noroeste argentino.

**NEA:** región del noreste argentino.

**IPE:** índice de precipitación estandarizado.

**°C:** grado Celsius.

**m:** metro.

**mm:** milímetro.

**ULP:** Universidad de la Punta

**DACC:** Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas del Ministerio de Economía de Mendoza

**EEAOC:** Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Tucumán

**COREBE:** Comisión Regional del Río Bermejo

## RED DE ESTACIONES

