



BOLETIN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO

TERCERA DÉCADA DE AGOSTO 2026

“2026 - Año Internacional de la Agricultora” (FAO)

Edición:

Natalia Soledad Bonel
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Redactores:

Natalia Soledad Bonel
Élida Carolina González Morinigo
María Eugenia Bontempi
Luciana Stoll Villarreal
Agrometeorología
Dirección Servicios Sectoriales
Servicio Meteorológico Nacional

Dirección Postal:

Servicio Meteorológico Nacional
Dorrego 4019 (C1425GBE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

Teléfonos:

5167-6767 (interno 18901)

Correo Electrónico:

agro@smn.gob.ar



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO



TERCERA DÉCADA de AGOSTO de 2026

Al comienzo de la década, gran parte del territorio se vió afectado por sistemas de alta presión, con un frente frío avanzando a la altura del sur del Litoral, lo que inhibió la formación de sistemas precipitantes en gran parte del país. Posteriormente, hacia el fin de la década, se destaca el pasaje de un frente cálido sobre el Litoral asociado a un sistema de baja presión posicionado en el centro del país y el avance de un frente frío desde Patagonia, patrón que favoreció la formación de nubosidad, algunas tormentas y caída de granizo al sur del Litoral y Mesopotamia. Por otro lado, en el extremo sur del país fueron activándose sistemas de baja presión que generaron el ingreso de masas de aire frío hacia el continente y sistemas de mal tiempo al oeste de la Patagonia.



Los mayores acumulados de lluvia se concentraron en la región cordillerana del norte patagónico y en la región mesopotámica. Si bien no se registraron acumulados excepcionales de precipitación, se destacan Bernardo de Irigoyen (Misiones) y El Bolsón (Río Negro), con valores entre 75 y 100mm.


El campo de anomalías de precipitación de esta década muestra déficits en gran parte del país, a excepción de zonas puntuales como el extremo noreste (Misiones) y noroeste de Patagonia (Neuquén y oeste de Río Negro), donde los acumulados superaron los valores esperados.






Las temperaturas máximas, en general, estuvieron por debajo del promedio; los mayores desvíos respecto a los valores medios se observaron en el centro-este del territorio. Las temperaturas mínimas, por su parte, estuvieron por encima de la normal en el norte del país, Cuyo y extremo sur de Patagonia; mientras que en el centro-este del país al igual que el centro de Patagonia fueron más bajas de lo normal.





La heliofanía efectiva en la tercera década presentó mínimos valores en Patagonia y centro-sur de la provincia de Córdoba.

Se produjeron heladas en la región Pampeana, el Litoral y centro del país. Las mayores frecuencias de días con helada se registraron en el centro y este de la provincia de Buenos Aires, alcanzando 7 días con temperaturas inferiores a 0°C.



Se destaca un notable humedecimiento de los suelos al sur de Neuquén y oeste de Río Negro producto de las precipitaciones registradas en la zona, donde se produjeron excesos. En el extremo noreste del país, los suelos se recargaron aún más respecto a la segunda década de agosto registrando excesos en esta región. Las condiciones hídricas de los suelos en la pampa húmeda van de deficitarias a óptimas, según el índice analizado. Respecto a la década anterior, los cambios más significativos se vieron en las provincias de Entre Ríos y Corrientes por desecamientos.

