

Resumen


Área total afectada por sequía

**6.467.950 hectáreas**

Variación del área afectada respecto a julio

**1M hectáreas aprox.**

La superficie nacional afectada por sequía aumentó respecto al mes anterior, aunque se mantuvo en valores mínimos históricos. En Patagonia se registró una reducción del área afectada, aunque el este de Chubut empeoró mostrando un núcleo de sequía moderada. Por su parte, en Cuyo emergió un foco en categoría leve en el noroeste de San Luis.



Para el cálculo de la duración se computan los meses consecutivos con una afectación mayor o igual al 10% del área total de cada región en categoría leve o cualquier porcentaje de área en categorías moderada o severa.

Factores en riesgo

Stock Ganadero

Canado Mayor

**1.604 Cabezas**

Canado Menor

**36.976 Cabezas**

Cultivos

**0 Hectáreas***

Población

**0 Hogares****

* Aclaración: el cálculo de las has de cultivos afectados se realiza mediante el cruce entre el área en sequía moderada y severa y las categoriales monitoreadas por ORSEP en la región Comahue y Patagonia, que se encuentran en periodo de crecida, en algunos casos continuaron con niveles de embalse menores a los esperados. En la cuenca del Plata los niveles en general, presentan condición de aguas medias en los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

** Este dato no contempla capitales de provincias ni distritales. Se calcula exclusivamente en casos de área afectada por categoría severa.

**Impacto**

En la Patagonia, particularmente en las áreas que permanecen bajo condiciones de sequía, se registraron disminuciones en la disponibilidad de forraje natural y en la condición corporal de los animales, junto con bajos niveles de agua en cauces no permanentes. En el resto del país no se registraron impactos de relevancia asociados al déficit hídrico.

Indicadores

**Precipitaciones**

Continuaron los excesos de precipitación en todo el norte del país, Litoral, zona cordillerana, norte y sudeste de Patagonia. Por el contrario los déficit se concentraron sobre el centro y sur de Buenos Aires, extremo noreste de Patagonia y Tierra del Fuego. Respecto al fenómeno ENOS, las condiciones actuales corresponden a una fase cálida o El Niño y el pronóstico prevé que se mantenga e intensifique con el transcurso de los meses.

**Hidrología**

Patagonia mantuvo una condición de riesgo alto de sequía hidrológica superficial, condición que no presenta perspectivas de reversión en el corto plazo. Las presas nacionales monitoreadas por ORSEP en la región Comahue y Patagonia, que se encuentran en periodo de crecida, en algunos casos continuaron con niveles de embalse menores a los esperados. En la cuenca del Plata los niveles en general, presentan condición de aguas medias en los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

**Indices de vegetación**

Los valores del índice de vegetación se mantuvieron cercanos o superiores al promedio histórico en gran parte del centro y norte del país. En contraste, en sectores de la Patagonia se observaron valores inferiores al promedio, con áreas puntuales por debajo del mínimo histórico en el norte y en la zona costera central de la región.

**Humedad del suelo**

Se evidenciaron aumentos en los almacenajes de agua del suelo en las regiones Noreste y Centro. En particular, en el transcurso del mes se registraron excesos principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En tanto, el noreste de la Patagonia persiste en bajo contenido de agua del suelo, mientras que el oeste mostró áreas con mejoras en cuanto a la disponibilidad hídrica en comparación al mes previo dadas las recargas por precipitaciones. Los indicadores mostraron un empeoramiento en el contenido de agua del suelo en la provincia de San Luis, cuyos almacenajes son cercanos al mínimo climatológico.

La red de estaciones del SMN y la continuidad de sus observaciones son fundamentales para garantizar la calidad de los índices e indicadores de monitoreo.